

ACADÉMIE DE LA VAL D'ISÈRE

« Moyenne faune de Tarentaise »

Conférence du mercredi 13 mars 2013

- En 2008, Martial vous proposait une conférence sur la « **Grande faune de Tarentaise** », évoquant essentiellement chevreuils, cerfs, sangliers, mouflons, bouquetins et chamois. Ce soir, le choix s'est porté sur ce qu'il a simplement appelé « **Moyenne faune** » et donc, nous restons avant tout dans la grande famille des mammifères. Les réserves sont les mêmes qu'il y a 5 ans. Cet exposé n'a pas de prétentions scientifiques, il s'agit plutôt d'attirer votre attention sur des animaux qui vous sont plus ou moins familiers et que, pour certains, vous rencontrez fréquemment dans votre environnement quotidien.

La faune moyenne

RÈGNE	animal
EMBRANCHEMENTS	vertébrés
CLASSE	mammifère

LE RENARD ROUX

ORDRE	carnivores
FAMILLE	canidæ
GENRE	vulpes
ESPÈCE	vulpes
NOM COMMUN	renard

Les cousins : renard argenté (*vulpes vulpes domesticus*) originaire d'Amérique, il a fait l'objet d'élevage pour sa belle fourrure sombre, gris argent. Il en existe une variété « platine » que l'on trouve également dans des élevages.

Amérique :

- renard polaire (*vulpes alopecurus lagopus*) qui peut avoir différents pelages, sombres ou clairs. Ce pelage varie en

fonction des saisons. Il habite toutes les régions arctiques

- renard bleu (*vulpes isatis*) variété sombre du renard polaire

- renard roux américain (*vulpes fulva*)

- renard gris (*urocyon* ou *vulpes cinereargenteus*) grimpe aux arbres

- renard à grandes oreilles ou kit fox (*vulpes macrotis*) max. 3 kg.

- renard à oreilles de chauve-souris

- renard véloce (*vulpes velox*).



Renard roux



Renard à grandes oreilles

Asie :

- renard des steppes (*vulpes corsac*) Nord Est de la Chine, Iran, grimpe aux arbres.

On a encore le :

- renard du Bengale (*vulpes bengalensis*)
- renard cana (*vulpes cana*) Pakistan Afghanistan
- renard tibétain (*vulpes ferrilata*).

Afrique :

- fennec (*vulpes zerda*) Afrique du nord, rare, c'est une sorte de mini renard, gros comme un lapin de garenne. Il pèse max. 1.5 kg, oreilles 15 cm.

- renard famélique (*vulpes ruppelli*) N-E de l'Afrique du Nord

- renard pâle ou blond des sables (*vulpes pallida*) Afrique du nord

- renard du cap (*vulpes chroma*) Afrique australe.



Fennec

Revenons à notre renard savoyard

POIDS 5 à 10 kg.

LONGUEUR 58 à 72 cm.

QUEUE 32 à 48 cm.

OREILLE

RÉPARTITION

Monde Europe, Asie, Amérique du Nord, Afrique du Nord.

France partout.

Savoie partout jusqu'à 3 000 m.

MATURITÉ SEXUELLE 10 mois, le rut a lieu de janvier à mars.

NID terrier, tapissé de poils et d'herbes sèches.

3 à 8 petits qui ouvrent les yeux à 12-15 jours, l'allaitement dure 1 mois, ils sont indépendants à 3-4 mois.

GESTATION 51 à 52 jours.

PORTÉE ANNUELLE 1

NOURRITURE rongeurs et invertébrés, baies, fruits, charognes, volaille.

CRIS le renard glapit, jappe ou aboie.

LONGÉVITÉ plus de 10 ans.



Renard

Crépusculaire et nocturne, sort aussi le jour, il vit dans des terriers à galeries multiples.

Il ne se croise pas avec le chien.

Il était autrefois détruit par enfumage des terriers ou gazé à la chloropicrine.

Il est classé nuisible. En 2012, c'est le seul nuisible en Savoie.

Chassé jadis au clair de lune, quand la peau valait cher, il ne l'est plus aujourd'hui qu'occasionnellement. Par contre, il continue à être piégé car c'est un prédateur de basse-cour et un vecteur de plusieurs maladies dangereuses.

Il était autrefois consommé après avoir été mis à geler une ou deux semaines, mais le goût très fort de la viande ne convenait pas à tous.

Vous vous souvenez, à Moûtiers c'est la semaine du printemps des poètes, alors écoutez :

Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?

- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..."

Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde ! Tu vois, là-bas, les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste ! Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé ! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé...

Vous avez, bien sûr, reconnu **Saint-Exupéry** :

« **Le petit prince et le renard** ».

Martial pourrait aussi vous chanter une jolie chanson, dont vous êtes sans doute nombreux à avoir les paroles en tête :

**Une fillette, un peu sauvage, avait soigné
Un renard, comme elle, sauvage et désarmé
Quand il a été guéri il est reparti
Emportant à son oreille un anneau de soleil
Mais il viendra rôder, peut-être, près du
ruisseau**

Et tu sauras le reconnaître, à cet anneau...



Le renard prédateur

Une chanson de Françoise Hardy (texte de Georges Moustaki) tirée de :

« **Le renard à l'anneau d'or** », feuilleton TV des années 70 (Chanson ci-dessus, générique)

Bref, vous l'avez compris, le renard est très présent dans l'imaginaire collectif, il a inspiré peintres, poètes et écrivains.

« **Le renard et l'enfant** », film sorti en 2007.

« **Le roman de Renart** » : recueil de récits médiévaux en vieux français des 12^e et 13^e siècles. Satire des comportements humains en se servant d'animaux.

La Fontaine : « **Le loup et le renard** », « **Le corbeau et le renard** », etc...

(Éventuellement lire ce qu'on dit du renard dans un dictionnaire chrétien de la fin du XVII^e).

LE BLAIREAU D'EUROPE

ORDRE carnivores.
FAMILLE mustelidæ ou mustélidés.
GENRE meles.



Blaireau

ESPÈCE meles.
NOM COMMUN blaireau « tachon » tesson, taissou.
POIDS 10 à 16 kg.
LONGUEUR 61 à 72 cm.
QUEUE 15 à 19 cm courte et fournie.
RÉPARTITION
Monde Europe sauf extrême nord, Asie.
France présent partout.
Savoie partout jusqu'à 2000 m.
MATURITÉ SEXUELLE 1,5 an, accouplement en juillet.

NID terrier.
 3 à 5 petits qui naissent entre janvier et mars. Ils ouvrent les yeux à 3 semaines, l'allaitement dure 8 semaines, ils sont indépendants à 6 mois.
GESTATION 7 à 8 mois.
PORTÉE ANNUELLE 1
NOURRITURE : omnivore.
CRIS reniflements, jappement, grognements, parfois cris affreux.
LONGÉVITÉ 15 ans.

Crépusculaire et nocturne, il vit dans des terriers étendus et ramifiés. L'entrée principale est caractérisée par sa forme en « toboggan ». Il y a un amoncellement de terre et déblais car il creuse et aménage son logis en permanence, le terrier peut descendre à 5 mètres de profondeur. C'est un excellent terrassier, ses pattes sont prévues pour ça. Au repos, l'hiver, il devient discret et sort lorsque la température s'adoucit. Le blaireau possède ses WC, en effet, il dépose ses excréments dans des dépressions qu'il creuse à proximité de son terrier.

Autrefois piégé et pris au collet, il était consommé, mais il a un goût très fort. Certain l'adorait, comme mon grand-père qui disait : « Si le boucher vendait du blaireau, j'en achèterais ».

Il n'est plus sur la liste des espèces nuisibles depuis 1995 et ne peut être que chassé. Cependant ses mœurs nocturnes le mettent à l'abri des chasseurs. Le plus souvent il est tué du fait de collision avec les voitures.



Blaireaux

Toujours le printemps des poètes ?

Le Blaireau (poème)

Pour faire ma barbe
Je veux un blaireau,
Graine de rhubarbe,
Graine de poireau.

Par mes poils de barbe !
S'écrie le blaireau,
Graine de rhubarbe,
Graine de poireau,

Tu feras ta barbe
Avec un poireau,
Graine de rhubarbe,
T'auras pas ma peau.

(Robert Desnos, Chantefables, 1944-1945)

LA MARMOTTE

ORDRE	rongeurs.
FAMILLE	sciuridæ.
GENRE	marmotta.
ESPÈCE	marmotta.
NOM COMMUN	marmotte.
POIDS	4 à 8 kg.
LONGUEUR	50 à 58 cm.
QUEUE	13 à 16 cm très fournie.

RÉPARTITION

Monde Alpes, Carpates,
Pyrénées, hautes montagnes d'Asie et
d'Amérique du Nord.

France Alpes, elle a été
introduite dans les Pyrénées.

Savoie partout en montagne.

MATURITÉ SEXUELLE

2, 3 ans, reproduction avril - mai.

NID terrier, 2 à 6 petits. Nus et aveugles, ils ouvrent les yeux à 3 semaines, l'allaitement dure 6 semaines, ils sont sevrés à 8 semaines mais restent avec les parents jusqu'au printemps suivant.

GESTATION 33 à 34 jours.

PORTÉE ANNUELLE 1

NOURRITURE herbes et feuilles.

CRIS sifflements aigus et ronflements.



Marmottes

LONGÉVITÉ 8 - 9 ans, jusqu'à 20 ans en captivité.

Diurne, très farouche, elle vit dans des terriers ramifiés, elle hiberne rassemblée avec plusieurs individus.

Bien chassée autrefois, elle ne l'est pratiquement plus car sa chair a un goût très prononcé.

Emblématique de la montagne et des alpages.

Dans l'imagerie populaire : les petits ramoneurs et les montreurs de marmottes.

Victor Hugo, dans **Les Misérables**, relate que **Jean Valjean doit sa conversion au bien à un petit Savoyard rencontré sur un sentier avec «sa vieille au flanc et sa boîte à marmotte sur le dos».**

« Et alors... la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'aluminium » Extrait d'une pub.

Marmotte: la concierge des alpages.

Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages (2008)

Citations de Sylvain Tesson.

Dormir comme une marmotte.



Marmottes

LE LIÈVRE COMMUN



Lièvre

ORDRE	lagomorphes.
FAMILLE	leporidæ.
GENRE	lepus capensis.
ESPÈCE	europæus.
NOM COMMUN	lièvre, capucin, oreillard, « la lyivre », bouquin.
POIDS	2.5 à 7 kg.
LONGUEUR	60 à 70 cm.
OREILLE	12 à 14 cm.
RÉPARTITION	
Monde	Europe, Asie, Afrique.
France	partout.
Savoie	partout, jusqu'à 1600 m.
MATURITÉ SEXUELLE	1 an, reproduction presque toute l'année, de janvier à octobre. Au moment du rut, les mâles se rassemblent, il y a des combats, on nomme cette période le bouquinage.
NID	gîte, 2 à 4 petits. Naissent velus, les yeux ouverts, ils quittent assez rapidement le nid, ils sont sevrés à 3 semaines.
GESTATION	40 à 43 jours.
PORTÉE ANNUELLE	3 ou 4.

NOURRITURE herbivore, il mange des petits rameaux, herbes, racines, baies, bourgeons, écorces. Son territoire peut s'étendre sur 300 hectares. On le trouve surtout en zone de cultures.

CRIS généralement muet mais peut émettre des cris aigus.

LONGÉVITÉ 10-12 ans.

Crépusculaire et nocturne, il est solitaire. Il gîte dans les sillons, dans un fossé, dans les broussailles, souvent en rase campagne dans une petite dépression de la taille de son corps, il y reste tapi jusqu'au dernier moment et démarre en catastrophe. Il nage très bien.

Deuxième gibier chassé autrefois.

Dans le parler populaire on lui attribue plusieurs noms : lièvre de bois, lièvre de plaine, lièvre de marais....

Malgré son goût prononcé, sa chair est appréciée par les amateurs.



Bouquinage

Poésie, littérature :

Le lièvre et la tortue, de La Fontaine. « *Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.* »

Le Lièvre de Vatanen est un roman de l'écrivain finlandais Arto Paasilinna, écrit en finnois en 1975 à Suomusjärvi.

Le **Lièvre de mars** (*March Hare* en anglais) est un personnage de Lewis Carroll, apparaissant aux côtés du Chapelier fou dans le roman *Alice au pays des merveilles* (1865).

En peinture : **Le lièvre**, d'Albrecht Dürer (1502).

LE LIÈVRE VARIABLE

ORDRE	lagomorphes.
FAMILLE	leporidæ.
GENRE	lepus.
ESPÈCE	timidus.
NOM COMMUN	blanchon, blanchot.
POIDS	2 à 5,8 kg.
LONGUEUR	40 à 54 cm.
QUEUE	4 à 6 cm.
OREILLE	6 à 9,5 cm.
RÉPARTITION	
Monde	Nord-est de l'Europe, partie nord de l'Asie, Amérique du Nord.
France	Alpes.
Savoie	présent au-dessus de 1200 m.



Le lièvre variable

MATURITÉ SEXUELLE 1 an, reproduction d'avril à août.
NID gîte, 2 à 5 petits naissent velus et les yeux ouverts.
GESTATION 45 à 53 jours.
PORTÉE ANNUELLE 2 à 3.
NOURRITURE herbivore et petits rameaux.
 Crépusculaire et nocturne, il gîte dans les rochers, il nage bien.
 Il peut s'hybrider avec le lièvre commun mais les petits sont stériles.
 C'est le lièvre de montagne qui devient blanc en hiver.
 Autrefois abondant, même sans chasse il a tendance à disparaître là où les alpages ne sont plus exploités.
 C'est un gibier difficile à chasser qui demande beaucoup de marche.
 Sa chair très appréciée ressemble à celle du lièvre commun mais elle est un peu plus fine.

LE LAPIN DE GARENNE

ORDRE lagomorphes.
FAMILLE leporidæ.
GENRE oryctolagus.
ESPÈCE cuniculus.
NOM COMMUN lapin de garenne,
 garenne.
POIDS 1,3 à 2,2 kg.
LONGUEUR 40 à 50 cm.
QUEUE 4 à 8 cm.
OREILLES 6,5 à 7,3 cm.
RÉPARTITION
Monde Afrique du Nord,
 presque toute l'Europe, introduit en
 Australie et Nouvelle-Zélande.
France partout.
Savoie partout en plaine. Il préfère les sols sablonneux, il aime le chaud et le sec.



Lapin de garenne

MATURITÉ SEXUELLE 8 mois, reproduction février à octobre dans le sud toute l'année.
NID dans un terrier, 5 à 12 petits nus et aveugles, ils ouvrent les yeux à 10 jours, l'allaitement dure 3 semaines et ils sont indépendants à 4 - 5 semaines.
GESTATION 28 à 31 jours.
PORTÉE ANNUELLE 4 à 6.
NOURRITURE végétarienne.
CRIS grognements, cris d'alarme aigus, le lapin martèle le sol avec ses pattes arrière.

C'est la souche d'origine du lapin domestique.

Il vit en groupe. Très abondant autrefois dans la plaine et sur les coteaux, on en trouve jusqu'à Aime. C'était le gibier le plus chassé. Il commettait souvent des dégâts en mangeant les cultures. En 1952 le docteur DELILLE apporte la myxomatose en France et, en 10 ans, tout le territoire est contaminé. 90 % des lapins périssent. Il a disparu pendant de nombreuses années mais depuis 2002-2003 il réapparaît timidement. En Savoie, en 2007, il est nuisible dans 15 communes (vignes et vergers). Les populations sont décimées par la myxomatose mais

également par un nouveau virus : la VHD Maladie Hémorragique Virale (*Virus Haémorrhagic Disease*) apparue en 1986.
Sa chair est délicate et parfumée.

« **Courir comme un lapin** », « **Poser un lapin** », « **Ça ne vaut pas un pet de lapin** », « **C'est un chaud lapin** », « **Recevoir le coup du lapin** ».

Symboliquement lièvre et lapin sont proches : animaux à l'inépuisable fécondité, associés à Vénus, représentent aussi la luxure ou la volupté. Mais le lapin blanc peut être un attribut de Marie.

Au Louvre, une toile, du Titien, « **La vierge au lapin** » de 1530.

Le lapin, considéré dans l'antiquité comme pouvant se reproduire sans rapport sexuel, rappelle la virginité de la Vierge et la conception du Christ sans péché, sa couleur blanche indiquant sa pureté.

Le lapin de Pâques. La viande de lapin est interdite par la tradition juive, de même que le lièvre, qui lui est apparenté.

Dans la littérature enfantine, la chanson « **Un lapin** » de Chantal Goya.

Bugs bunny, les dessins animés.

Les lapins crétiens.

Les lapins Duracell, dans la pub.

En astrologie, le lapin est un signe de l'horoscope chinois et du calendrier des Aztèques. Pour ces derniers le lapin est un signe bénéfique, symbole d'abondance et de travail même s'il est aussi associé à la crainte et à l'ivrognerie. Pour les Chinois les gens nés sous le signe du Lapin sont d'un naturel aimable, franc, honnête, diplomate et aimés par leur entourage et leurs aînés.



Lapin de garenne

LA FOUINE

ORDRE	carnivores.
FAMILLE	mustelidæ ou mustélidés.
GENRE	martes.
ESPÈCE	foina.
NOM COMMUN	fouine.

Brune avec une bavette blanche ou jaunâtre divisée en deux lobes vers le bas.

POIDS	1 à 2,3 kg.
LONGUEUR	42 à 48 cm.
QUEUE	23 à 26 cm, touffue.

RÉPARTITION

Monde	Europe sauf extrême nord, Asie.
--------------	---------------------------------



fouine

France	partout.
Savoie	présente partout.
MATURITÉ SEXUELLE	2 à 3 ans, l'accouplement a lieu de juin à août.
NID	dans un trou, arbre creux, 2 à 5 petits naissent en avril, ils ouvrent les yeux à 34-38 jours, l'allaitement dure 7-8 semaines, ils sont autonomes à 3 mois.
GESTATION	245 à 289 jours (pause embryonnaire).
PORTÉE ANNUELLE	1.
NOURRITURE	petits mammifères, oiseaux, œufs, nichées, volaille.
VOIX	la fouine gronde et souffle.


Animal nocturne, elle n'est pas chassée mais piégée car elle anéantit les basses-cours. Elle était classée nuisible en France mais, depuis quelques années, elle ne l'est plus dans tous les départements ; cette année elle a été enlevée des nuisibles en Savoie.

De la même famille, la zibeline (*martes zibellina*) certainement disparue du nord-est de l'Europe, habite le nord de l'Asie. Elle a été décimée à cause de la grande valeur de sa fourrure.

LA MARTRE DES PINS

ORDRE	carnivores.
FAMILLE	mustelidæ ou mustélidés.
GENRE	martes.
ESPÈCE	martes.
NOM COMMUN	martre ou marte.
De couleur brune avec une bavette orange à une seule courbe et prolongée par des taches.	
Biologie identique à la fouine.	
NOURRITURE	petits mammifères (écureuils), oiseaux (jusqu'au coq de bruyère), œufs, nichées, volaille, insectes, fruits, faines.
VOIX	comme la fouine.
LONGÉVITÉ	10 - 12 ans.

Animal nocturne, ce qui ne l'empêche parfois d'être active de jour. Elle grimpe et saute très bien, jusqu'à 4 mètres d'un arbre à l'autre. C'est une prédatrice de gibier surtout de coq de bruyère et d'écureuil. Ses effectifs ont chuté en même temps que ceux de l'écureuil. Du fait de sa raréfaction, elle, a été retirée de la liste des nuisibles en 1997, sauf dans 6 communes du Val d'Arly.



Martre des pins

De la famille des « puants », elle ne se consomme pas.

LE PUTOIS

ORDRE	carnivores.
FAMILLE	mustelidæ ou mustélidés.

GENRE mustela.
ESPÈCE putorius.
NOM COMMUN putois.
POIDS 500 g à 1,2 kg.
LONGUEUR 31 à 45 cm.
QUEUE 12 à 19 cm, touffue.
RÉPARTITION
Monde Europe, Afrique du Nord, Asie.
France présent partout.
Savoie rare, mais parfois présent surtout à proximité de l'eau, jusqu'à 2 000 mètres d'altitude.

NOURRITURE petits mammifères, rats, souris, petits oiseaux et couvées, grenouilles, lézard, mollusques, poissons, insectes...

CRIS
grondements,
caquètements,
glapissements aigus.

LONGÉVITÉ 8 - 10 ans.

Crépusculaire et nocturne,
il nage et plonge très bien.

Il a une odeur très marquée due à ses glandes anales.

La très forte odeur de sa chair la rend inconsommable.

Le furet est la forme domestique du putois (parfois albinos).



Putois


Toujours de la poésie ?

Le putois ne sent pas l'odeur de ses aisselles. Proverbes africains [Proverbe du Niger].

L'HERMINE

ORDRE carnivores.
FAMILLE mustelidæ ou mustélidés.
GENRE mustela.
ESPÈCE erminea.
NOM COMMUN hermine.
Elle est de la taille du rat.
POIDS 125 à 300 g.
LONGUEUR 22 à 29 cm.
QUEUE 8 à 12 cm poilue.
RÉPARTITION

Monde Europe sauf extrême nord, Asie, Algérie et Amérique du Nord.
France présente partout.
Savoie partout jusqu'à 3000 mètres.
MATURITÉ SEXUELLE femelle : 3 mois, mâle : 9 mois.
NID trou, cavité, 4 à 16 petits (moyenne : 8).
GESTATION 2 mois le printemps, 9 mois l'automne, avec pause embryonnaire.
PORTÉE ANNUELLE 1.
NOURRITURE petits rongeurs, oiseaux, œufs, rarement fruits sauvages.
LONGÉVITÉ 10 ans.
Active de jour et de nuit, elle nage et grimpe bien, elle est curieuse et peu farouche.
Comme le lagopède et le lièvre variable, l'hermine devient blanche, l'hiver dans les montagnes, excepté le bout de la queue qui reste noir. Au sud de la France elle ne change pas de couleur, Elle est assez rare, on n'en voit pas très souvent.



Hermine

Signifie la pureté, la chasteté car selon la légende elle préfère mourir plutôt que tacher sa fourrure. Elle signifie aussi la résurrection, c'est le symbole du toucher, c'est l'emblème héraldique des ducs de Bretagne.
Elle peut être un attribut de la Vierges Marie et d'autres saintes vierges.
Hermine est un prénom féminin.

A l'instar du furet, l'hermine est restée un animal de compagnie durant tout le Moyen Âge et l'usage ne tombera complètement en désuétude qu'à partir de l'époque romantique.

Peinture : le célèbre tableau « **La Dame à l'hermine** » de Léonard de Vinci, portrait de Cecilia Gallerani, atteste de cette mode.

Livres : **Le sang de l'hermine**, de Michèle Barrière, roman historique (Florence, Léonard de Vinci...); **L'hermine était pourpre**, de Pierre Borromée - Prix du Quai des Orfèvres 2012.

L'hermine, le castor et le sanglier. Fable de Jean-Pierre Claris de Florian (1755/1794).

LA BELETTE D'EUROPE

ORDRE carnivores.
FAMILLE mustelidæ ou mustélidés.
GENRE mustela.
ESPÈCE nivalis.
NOM COMMUN belette.



Belette

Plus petite que l'hermine, elle émet les mêmes cris et elle est de couleur brune, elle devient blanche en haute montagne, même la queue qui n'est jamais noire.

POIDS 75 à 130 g

femelle 45 à 75 g.

LONGUEUR 17 à 23 cm.

QUEUE 3 à 6,5 cm, poilue.

RÉPARTITION

Monde Europe sauf extrême nord, Asie, Afrique du Nord, peut-être Amérique du Nord.

France partout.

Savoie présente mais rare, jusqu'à 3000 m.

NOURRITURE vertébrés, rongeurs jusqu'au lapin.

LONGÉVITÉ 7 - 8 ans.

Elle est rare en Savoie, elle a été retirée de la liste des nuisibles en 1992.

Son nom de *petite belle* se retrouve sous des formes voisines (*petite femme*, *petite fiancée*, etc.) dans bon nombre de langues : *donnola* en italien, *donicela* en galicien, *doninha* en portugais (les trois signifiant « petite femme »), *comadreja* en espagnol (« petite marraine »), *kaerell* (dérivé de *kaerr*, « beau ») en breton, *Schöntierlein*, (belle petite bête) dans certaines régions d'Allemagne. « Belette » s'emploie aussi en français pour désigner affectueusement une jeune fille ou une femme charmante.

Paroles de la chanson « **Mais Qui Est La Belette** » **Manau** (groupe de Rap, inspiré par une vieille chanson populaire).

Mais qui est la Belette ? Paroles : Martial Tricoche 1999

J'entends le loup, le renard et la belette.
J'entends le loup, et le renard chanter
J'entends le loup, le renard et la belette.
J'entends le loup, et le renard chanter

La fable **Le chat, la belette et le petit lapin**, de Jean de la Fontaine.

L'ÉCUREUIL D'EUROPE

ORDRE rongeurs.
FAMILLE sciuridæ.
GENRE sciurus.
ESPÈCE vulgaris.

NOM COMMUN	écureuil « verdache », verdasse, verdesse. On en trouve avec une grande variété de coloris du noir au roux.
POIDS	230 à 480 g.
LONGUEUR	20 à 28 cm.
QUEUE	14 à 24 cm touffue et en panache.
RÉPARTITION	
Monde	Europe sauf extrême nord, nord de l'Asie.
France	partout.
Savoie	partout, jusqu'à 2000 m, souvent noir en montagne, roux en plaine.
MATURITÉ SEXUELLE	1 an. Reproduction de janvier à août.
NID	à la cime des arbres, 3 à 7 petits, nus et aveugles (8 à 12 g) ils ouvrent les yeux à 31 jours, l'allaitement dure 5-6 semaines, ils sont indépendants à 7- 8 semaines.
GESTATION	38 à 39 jours.
PORTÉE ANNUELLE	2.
NOURRITURE	graines d'arbre, baies, œufs.
LONGÉVITÉ :	8 - 10 ans (18 ans).

Grimpe et saute avec agilité, il fait son nid dans un trou ou au sommet d'un arbre. Il n'hiberne pas mais passe l'hiver au ralenti. Il a l'habitude de faire des réserves de nourriture et oublie parfois où il les a stockées.

Autrefois, il était couramment chassé, et consommé régulièrement. Le faible poids de viande faisait que certains disaient : « l'écureuil c'est bon mais il faut le faire cuire avec 1 kg de pommes de terre pour faire un repas ». Il est protégé depuis 1976. Il a beaucoup régressé mais revient peu à peu.

Peinture : **Un écureuil roux**, par Hans Hoffmann (aquarelle et gouache, 1578).

En héraldique, l'écureuil est le symbole de la prévoyance, de l'agilité, de la vivacité et de l'indépendance ou bien encore des contrées boisées. S'il est d'azur, il symboliserait la foi dans le commerce, s'il est de sable il symboliserait « un homme juste qui corrige les vices ».

Nicolas Fouquet, intendant général des finances de Louis XIV, portait sur ses armes un écureuil (*fouquet* en patois) accompagné de la devise *Quo non ascendet ?* (« Jusqu'où ne montera-t-il pas ? » en latin).

Expression : « **agile comme un écureuil** »

L'image de l'écureuil stockant ses noisettes est souvent associée à l'idée d'épargne. C'est pourquoi, en France, le logo du Groupe Caisse d'épargne est un écureuil. Par ailleurs, cet animal est l'emblème de l'équipe nationale de football du Bénin.

Le poème de Paul Fort (1872-1960) « **L'écureuil** » :



Écureuil

Écureuil du printemps, écureuil de l'été, qui domines la terre avec vivacité, que penses-tu là-haut de notre humanité ?

- Les hommes sont des fous qui manquent de gaîté.

Écureuil, queue touffue, doré trésor des bois, ornement de la vie et fleur de la nature, juché sur ton pin vert, dis-nous ce que tu vois ?

- La terre qui poudroie sous des pas qui murmurent.

Écureuil voltigeant, frère du pic bavard, cousin du rossignol, ami de la corneille, dis-nous ce que tu vois par-delà nos brouillards ?

- Des lances, des fusils menacer le soleil.

Écureuil, cul à l'air, cursif et curieux, ébouriffant ton col et gloussant un fin rire, dis-nous ce que tu vois sous la rougeur des cieux ?

- Des soldats, des drapeaux qui traversent l'empire.

Écureuil aux yeux vifs, pétillants, noirs et beaux, humant la sève d'or, la pomme entre tes pattes, que vois-tu sur la plaine autour de nos hameaux ?

- Monter le lac de sang des hommes qui se battent.

Écureuil de l'automne, écureuil de l'hiver, qui lance vers l'azur, avec tant de gaîté, ces pommes... que vois-tu ?

- Demain tout comme Hier. Les hommes sont des fous et pour l'éternité.

LE LOIR

ORDRE	rongeurs.
FAMILLE	gliridaë (loirs, lérots muscardins).
GENRE	glis.
ESPÈCE	glis.
NOM COMMUN	loir, rat gris.
POIDS	70 à 200 g (300g)
RÉPARTITION	
Monde	Europe centrale et méridionale Asie Mineure et Proche Orient.
France	partout.
Savoie	partout, jusqu'à 1500 m, surtout dans les forêts de feuillus.
NOURRITURE	principalement graines, baies mais aussi insectes, escargots, œufs, oisillons, petits mammifères fruits, noix.
LONGÉVITÉ	5 - 6 ans.

Il vit dans les régions boisées, les vergers, les vignobles, se cache souvent dans les trous de murs ou de rochers.

Crépusculaire et nocturne il grimpe parfaitement sur les arbres.

Le sommeil hivernal s'interrompt de temps en temps quand la température s'adoucit.

Le rat gris était consommé, on lui trouvait une chair très fine mais odorante.



Loir



Lérot

LE LÉROT

ORDRE	rongeurs.
FAMILLE	gliridæ (loirs, lérots muscardins).
GENRE	eliomis.
ESPÈCE	quercinus.
NOM COMMUN	lérot.
POIDS	45 à 120 g.
NOURRITURE	insectes, escargots, œufs, oisillons, petits mammifères, fruits, graines, baies, noix.

Il vit dans les régions boisées, les vergers, les vignobles, se cache

souvent dans les trous de murs ou de rochers. Crépusculaire et nocturne il est souvent à terre mais grimpe parfaitement sur les arbres.

Le sommeil hivernal s'interrompt de temps en temps quand la température s'adoucit.

LE HÉRISSON

ORDRE	insectivores.
FAMILLE	hérisson.
GENRE	erinaceus.
ESPÈCE	erinaceus.
NOM COMMUN	hérisson.
POIDS	450 à 1,2 kg.
LONGUEUR	25 cm.
QUEUE	3 cm.
RÉPARTITION	
Monde	Europe et une partie de l'Asie.
France	partout.
Savoie	partout.
PORTÉE ANNUELLE	2.
NOURRITURE	insectes, mollusques, vers, souris, parfois œufs et jeunes oisillons.

Crépusculaire, il passe la journée couché dans les feuilles mortes, dans une pile de bois, un tas de fumier dans divers trous. L'hiver, il reste dans un nid de feuilles et sort si la température s'adoucit. Par grands froids, il vit sur ses réserves.

La femelle s'occupe des petits jusqu'à 40 - 45 jours.

Le hérisson était consommé par les gens du voyage qui venaient de l'est.

Dans le sud-ouest, en Espagne, Baléares et Afrique du Nord il existe le hérisson d'Algérie (*erinaceus algirus*) un peu plus haut sur pattes, avec des oreilles plus grandes, il a les mêmes mœurs que le nôtre.



Hérisson

NOUVEAUX ARRIVANTS

LE CASTOR

ORDRE	rongeurs.
FAMILLE	castor.
GENRE	castor.
ESPÈCE	fiber.
NOM COMMUN	castor.
POIDS	12 à 35 kg.
LONGUEUR	80 à 100 cm.
QUEUE	35 cm nue et plate, couverte d'écailles.
RÉPARTITION	
Monde	Europe et nord de l'Asie celui d'Amérique du Nord est différent (castor canadensis).
France	ça et là.
Savoie	dans l'Isère et embouchures des ruisseaux.
MATURITÉ SEXUELLE	4 ans.
NID	terrier, 2 à 3 petits. Ils ont les yeux ouverts, l'allaitement dure 8 semaines. Les jeunes restent avec la mère pendant 3 ans.
GESTATION	105 à 107 jours. Le rut a lieu en février - mars.
PORTÉE ANNUELLE	1.
NOURRITURE	plantes aquatiques, écorces et bois tendre des arbres qu'il abat lui-



Castor

	même.
CRIS	émet parfois des sortes de ronflements.
LONGÉVITÉ	15 - 20 ans.



Travail du castor

Crépusculaire et nocturne, peut rester sous l'eau pendant 10 minutes.
Ses pieds sont palmés. C'est le plus grand rongeur européen, il vit dans des terriers souterrains creusés dans les berges des cours d'eau et dont l'entrée se trouve sous le niveau de l'eau.

LE RAGONDIN

ORDRE	rongeurs.
FAMILLE	ragondins.
GENRE	myocastor.
ESPÈCE	coypus.
NOM COMMUN	ragondin.
POIDS	6 à 9 kg.
LONGUEUR	42 à 60 cm.
QUEUE	30 à 45 cm

cylindrique et glabre.

RÉPARTITION

Monde Amérique du Sud.

France presque partout.

Savoie le long des cours d'eau. Introduit comme animal à fourrure et retourné accidentellement à l'état sauvage.

MATURITÉ SEXUELLE 5 - 6 mois. Accouplement toute l'année.

NID vit en petites colonies dans des terriers creusés dans les berges des cours d'eau dont l'entrée est sous l'eau.

5 à 6, naissent velus et les yeux ouverts. Les petits sont autonomes à 32 mois.

GESTATION 128 à 132 jours.

PORTÉE ANNUELLE 2.

NOURRITURE herbes, céréales, plantes aquatiques, racines, fruits sauvages.

LONGÉVITÉ 4-5 ans

CRIS miaule, crache et grogne.

Généralement diurne, il plonge et nage très bien. Ses pieds sont munis de palmures.

Là où il est abondant, le ragondin est consommé en pâtés et ragoûts.



Ragondin

LE CHIEN VIVERIN

ORDRES carnivores.

FAMILLE canidés (loups, chacals, renards).



Chien viverin

GENRE nyctereutes.

ESPÈCE procyonoïdes.

NOM COMMUN chien viverin.

Il est de la taille du renard mais plus trapu.

POIDS 5 à 10 kg.

LONGUEUR 55 à 65 cm.

QUEUE 15 à 17 cm poilue.

RÉPARTITION

Monde originaire d'Extrême Orient, a été introduit en URSS et se propage régulièrement dans toute l'Europe.

France s'implante dans le nord, dans les régions humides, forêts, taillis.

Savoie sans doute encore

absent.

Biologie semblable au renard, habite d'ailleurs dans les vieux terriers de celui-ci.

NOURRITURE poissons, petits vertébrés, couvées d'oiseaux, mollusques, insectes, fruits sauvages, glands.

VOIX fait des miaulements sourds.

LE RATON LAVEUR

ORDRE carnivores.

FAMILLE procyonidés.

GENRE procyon.

ESPÈCE lotor.

NOM COMMUN raton laveur.

Il vit dans les forêts feuillues, les parcs, à proximité de l'eau.

POIDS 5 à 6 kg.

LONGUEUR 48 à 70 cm.

QUEUE 20 à 26 cm touffue.

Comme l'ours, il est plantigrade.

RÉPARTITION

Monde Amérique du Nord
introduit comme animal à fourrure où, sorti des enclos, il est retourné à l'état sauvage.

France présent dans le nord et l'est.

Savoie encore absent.

MATURITÉ SEXUELLE accouplement janvier-mars.

NID terrier, 3 à 4 petits naissent en avril-mai, ouvrent les yeux à 18 jours. L'allaitement dure 7 semaines et les petits sont indépendants à 1 an.

GESTATION 63 jours.

PORTÉE ANNUELLE 1.

NOURRITURE : omnivore, petits vertébrés, insectes, escargots, fruits sauvages. Il fait de gros dégâts aux nichées d'oiseaux.

LONGÉVITÉ 6 - 8 ans.

Il nage bien et grimpe très bien aussi, il a l'habitude de laver les aliments avant de les consommer, d'où son nom.

Crépusculaire et nocturne, il vit dans un terrier, un arbre creux ou une crevasse de rocher.

L'hiver, il reste inactif pendant de longues périodes et vit grâce à ses réserves de graisse.



Raton laveur

LA GENETTE

ORDRE carnivores.

FAMILLE viverrinées (civette, genette).

GENRE genetta.

ESPÈCE genetta.

NOM COMMUN genette, ressemble à un chat très allongé de couleur beige clair à gris clair.

RÉPARTITION

Monde sud-ouest de l'Europe et Afrique.

France sud de la France, isolée a été vue jusqu'en Alsace. Vit dans les régions à végétation dense.

Savoie ?

NOURRITURE petits vertébrés, œufs, oiseaux, insectes.

LONGÉVITÉ 10 -15 ans.

Crépusculaire et nocturne, rarement visible, elle grimpe et saute très bien. Elle vit dans les arbres creux, les crevasses, les grottes...



Genette

LE CHAT SAUVAGE

ORDRE carnivores.

FAMILLE félidés.

GENRE felis.

ESPÈCE silvestris.

NOM COMMUN chat sauvage d'Europe, chat forestier.

POIDS 5 à 18 kg.

LONGUEUR 47 à 68 cm.

QUEUE 26 à 37 cm touffue.

RÉPARTITION

Monde Europe occidentale et centrale, l'Asie et Afrique du Nord.

France arrivé par l'est (Allemagne), il s'est implanté un peu partout où il y a de la forêt.

Savoie certainement partout mais il est très discret. Il vit dans les forêts épaisses, il est généralement solitaire.

NOURRITURE petits rongeurs et mammifères (jusqu'au faon), oiseaux, nichées, petits vertébrés, insectes.

LONGÉVITÉ 12-15 ans.

Grimpe et saute avec agilité, il loge dans des creux d'arbres, de rocher etc...



Chat sauvage

LE LYNX

ORDRE carnivores.

FAMILLE félidés (chats, lynx).

GENRE felis.
ESPÈCE pardina.
NOM COMMUN lynx pardelle.
POIDS 15 à 35 kg.
LONGUEUR 85 à 110 cm.
QUEUE 12 à 13 cm.
RÉPARTITION
Monde Europe centrale.
France moitié est
Savoie certainement partout
dans les forêts épaisses et les broussailles, il est généralement solitaire.
PORTÉE ANNUELLE 1
NOURRITURE mammifères (jusqu'au chevreuil), oiseaux.
LONGÉVITÉ 16-18 ans.



Lynx

Grimpe, court et saute avec agilité, il loge dans des creux d'arbres, de rocher etc...
Il est très farouche et vit solitaire.

ANIMAUX DISPARUS

LA LOUTRE D'EUROPE

ORDRE carnivores.
FAMILLE mustelidæ ou mustélidés.
GENRE lutra.
ESPÈCE lutra.
NOM COMMUN loutre.
POIDS 6 à 15 kg.
LONGUEUR 62 à 83 cm.



Loutre d'Europe

QUEUE 36 à 55 cm,
longue et épaisse à la base.

RÉPARTITION

Monde Europe sauf îles de la Méditerranée, Asie et Afrique du Nord.

France partout autrefois, devenue rare.

Savoie présente autrefois, jusqu'à 2 500 m, très rare aujourd'hui, voire disparue.

NOURRITURE principalement poissons, grenouilles.

VOIX sifflements doux, miaulements, grognements, cris aigus.

LONGÉVITÉ 15 - 18 ans.

Crépusculaire et nocturne, elle nage et

court vite. Elle fréquente plusieurs terriers, abris naturels dans les berges, l'entrée se trouve

sous l'eau.

Autrefois bien présente, elle vivait isolée ou par petits groupes le long des cours d'eau. Au début du XX^e siècle, on attribuait des primes pour sa capture. Devenue très rare elle est totalement protégée. Elle peut se trouver jusqu'à 2500 m, et reste 7 minutes en plongée. En Savoie, on la considère comme disparue.

Sa chair, à forte odeur de poisson, n'est pas consommée.

L'OURS

ORDRE	carnivores.
FAMILLE	ours, ursidés.
GENRE	ursus.
ESPÈCE	arctos.
NOM COMMUN	ours.
POIDS	80 à 230 kg.
LONGUEUR	1,70 à 2,50 m.
QUEUE	6 à 14 cm.
GARROT	90 à 100 cm.
NOURRITURE	omnivore : végétaux, animaux, poissons, fruits, racines, miel etc...

Il y a toujours eu des ours, mais les populations ont augmenté quand le loup a disparu. C'est un prédateur dangereux pour le bétail, il est donc chassé et combattu : chasse, poison, pièges, trappes à l'ours...

Dans les Vosges il disparaît au début du XIX^{-ème} siècle. En Savoie le dernier est tué le 13 août 1921, à 12 h 30 au col de Montgeois, vers 2 000 m d'altitude, sur la commune de Montgellafrey. Il s'agit d'une vieille femelle de 105 kg. L'avant-dernier (une femelle de 100 kg) a été tué non loin de là, en février 1920 près du col du Grand Cucheron.

En 1782, l'Intendant de Tarentaise évoque la nécessité d'organiser une battue générale contre les ours qui ravagent les communes de Monthion, Grignon, Ste Hélène... il est nécessaire d'étendre la mesure aux communes de St Thomas et St Paul qui se trouvent dans le même cas.

A Cevins on en tue un le 20 octobre 1846 ; à St Paul en octobre 1863, on tue une femelle de 10 à 12 ans ; à Pussy, le 9 septembre 1883 on tue un mâle ; en 1885 le dernier ours de la commune a été tué par Benjamin GARÇON, habitant au hameau du Fracheray, puis un en forêt de Monthion, en 1889.

En 1893, lors d'une battue aux ours à St Paul, aucun n'est aperçu.



Ours

Tous ces animaux peuvent être atteints d'albinisme. Le phénomène reste néanmoins rare chez cette faune moyenne, on peut trouver le renard,



Renard albinos

la marmotte,
le ragondin,



Marmotte albinos



Ragondin albinos

l'écureuil...

Il est plus fréquent sur la grande faune.



Écureuil albinos

Comme chez le
chevreuil,



Chevreuil albinos

le sanglier...



Sanglier albinos

Cette conférence a été présentée à l'Académie de la Val
d'Isère par Martial BLANC
le mercredi 13 mars 2013.